

# インフルエンザ予防接種を受けた後の注意

次のようなことにお気をつけください！

1. 予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。接種後、24 時間（特に接種直後 30 分以内）は副反応の出現に注意してください。

☆ 考えられる副反応

接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる。

全身のじんましん、繰り返す嘔吐（おうと）、顔色の悪さ、低血圧 など

副反応が現れたら、医師（医療機関）の診察を受けてください。その他、分からないときは下記へお問い合わせください。

2. 予防接種当日の入浴は接種後 1 時間を経過すれば差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
3. 接種当日はいつもどおりの生活をして構いませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
4. 接種後、抵抗力がつくまでに 2 週間程度を要します。

## 【接種後の問い合わせ先】

接種した医療機関	
市役所 (平日のみ)	◇ 筑紫野市（カミーリヤ） Tel 9 2 0 - 8 6 1 1 ◇ 春日市（いきいきプラザ） Tel 5 0 1 - 1 1 3 4 ◇ 大野城市（すこやか交流プラザ） Tel 5 0 1 - 2 2 2 2 ◇ 太宰府市（保健センター） Tel 9 2 8 - 2 0 0 0 ◇ 那珂川市（保健センター） Tel 9 5 3 - 2 2 1 1
消防 (休日・夜間当番医の 問い合わせ)	◇ 筑紫野太宰府消防本部(筑紫野市・太宰府市の方) Tel 9 2 4 - 5 0 3 4 ◇ 春日大野城那珂川消防本部(春日・大野城・那珂川市の方) Tel 5 8 4 - 1 1 9 1