







子宮頸がん（HPV）ワクチン 接種対象者・対象年齢

- ✧ 小学6年生～高校1年生に相当する年齢の女子
（標準的な接種学年は中学1年生）
- ✧ 積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方のうち、
平成9年度生まれから平成19年度生まれ（平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれ）で
過去に合計3回の子宮頸がんワクチン接種を終えていない女子
〔接種期限〕 令和7年3月31日まで

ワクチン名	接種間隔	
	標準	左記の接種間隔を取れない場合
サーバリックス （2価）	初回（1回目） →初回から1か月後（2回目） →初回から6か月後（3回目） 	初回（1回目） →初回から1か月以上の間隔（2回目） →初回から5か月以上、かつ2回目から2.5か月以上の間隔（3回目） 
	1回目 2回目 3回目 ※少なくとも2.5か月以上あける 1か月後 5か月後 6か月後	1回目 2回目 3回目 1か月以上あける 2.5か月以上あける 5か月以上あける
ガーダシル （4価）	初回（1回目） →初回から2か月後（2回目） →初回から6か月後（3回目） 	初回（1回目） →初回から少なくとも1か月以上の間隔（2回目） →2回目から少なくとも3か月以上の間隔（3回目） 
	1回目 2回目 3回目 ※少なくとも3か月以上あける 2か月後 4か月後 6か月後	1回目 2回目 3回目 少なくとも1か月以上あける 少なくとも3か月以上あける
シルガード （9価） ・15歳未満は 接種スケジュール が異なります	3回接種 初回（1回目） →初回から2か月後（2回目） →初回から6か月後（3回目） 	初回（1回目） →初回から少なくとも1か月以上の間隔（2回目） →2回目から少なくとも3か月以上の間隔（3回目） 
	2回接種 （注） 初回（1回目） →初回から6か月後（2回目） 	初回（1回目） →初回から少なくとも5か月以上の間隔（2回目） 

1年以内に接種を終了することが望ましい

※15歳未満は接種スケジュールが異なります。

※15歳になるまで【小学校6年生の学年から、15歳の誕生日の前日（15歳未満）】の間に1回目の接種を行えば、2回での接種が可能です。

※接種間隔が5か月未満で2回目を接種した場合は3回目の接種が必要です。